TABLEAU SYNOPTIQUE DE LA DIVISION, EN XXV GROUPES, DES ESPÈCES CONNUES DU GENRE ROSIER.

§. I[er].

RÉUNION ARTIFICIELLE D'APRÈS LES DIFFÉRENTS ÉTATS DES TIGES.

α. GRIMPANTES OU COUCHÉES.				β. MUNIES D'AIGUILLONS DROITS, OU DE POILS FLEXIBLES.			γ Munies d'aiguillons stipulaires crochus, géminés, parfois verticillés.	δ. PEU OU POINT D'AIGUILLONS.	
I. SIMPLICIFOLIÆ.	II. FLORIDÆ.	III. LÆVIGATÆ.	IV. BANCKSIENENSES.	V. SPINOSISSIMÆ.	VI. HISPIDÆ.	VII. AMERICANENSES.	VIII. CINNAMOMEÆ.	IX ALPINENSES.	X. HUDSONIANÆ.
Rosiers à feuilles simples.	A bractées et stipules profondément incisées; beaucoup de fleurs.	A feuilles de trois, rarement de cinq folioles.	A bractées libres; à fleurs disposées en une ombelle parfaite.	A tiges armées d'un grand nombre d'aiguillons fermes, droits, d'inégale longueur. Pédoncules uniflores.	A tiges chargées d'une multitude de poils droits, flexibles, presque égaux, parfois entremêlés d'aiguillons.	A tiges munies d'aiguillons stipulaires opposés, presque droits; folioles finement et simplement dentées.	A tiges armées d'aiguillons stipulaires crochus, géminés, parfois verticillés.	A tiges presque toujours sans aiguillons; folioles bidentées; stipules dilatées.	A tiges absolument glabres; à stipules roulées.
1. *R. Berberifolia.*	2. *R. multiflora.* 3 *Noisettiana*	4. *R. nivea.*	5. *R. Bancksiæ.*	6. *R. pimpinellifolia.* 7. *R. Reduteana.* 8. *R. myriacantha.* 9. *R. Kamschatka.*	10. *R. hispida.* 11. *R. Candolleana.*	12. *R. Caroliniana.* 13. *R. lucida.* 14. *R. parviflora.* 15. *R. setigera.*	16. *R. cinnamomea.*	17. *R. Alpina.*	18 . *R. Hudsoniana.*

§. II.

RÉUNION ARTIFICIELLE D'APRÈS LES DIVERSES MODIFICATIONS DES FOLIOLES.

XI. VILLOSÆ.	XII. COLLINÆ.	XIII. CENTIFOLIÆ.	XIV. POMPONIANÆ.	XV. SEMP. FLORENTES.	XVI. GALLICÆ.	XVII. ALBÆ.	XVIII. MONTANÆ.	XIX. CYNORRHODONENSES.	XX. GLANDULOSÆ.	XXI. SPINOSULÆ.
Folioles velues sur les deux faces et sur la bordure.	Folioles glabres en dessus, velues en dessous et sur la bordure : simplement dentées.	Folioles molles au toucher, pubescentes en dessous, munies en leur bord d'un duvet entremêlé de glandes: bidentées.	Folioles arrondies présentant les mêmes caractères que le précédent, mais plus fermes, et simplement dentées.	Folioles glabres en dessus, velues en dessous, ciliées, mais non glanduleuses en leur bord; simplement dentées.	Folioles fermes, comme cassantes, finement et doublement dentées; glabres en dessus, pubescentes en dessous.	Folioles pubescentes en dessous, simplement dentées; tubes brusquement arrondis à la base.	Folioles serraturées, glabres sur les deux faces, seulement glanduleuses en leur bord.	Folioles glabres sur les deux faces et sur la bordure; bractées opposées ciliées ou glanduleuses.	Folioles glabres ou pubescentes en dessus, couvertes de glandes en dessous et sur les bords.	Folioles glabres en dessus, couvertes, en dessous, tant sur les nervures ordinaires que sur les nervures confuses, d'un grand nombre de petites épines, entremêlées de glandes.
19. *R. villosa.* 20. *R. mollissima.* 21. *R. tomentosa.* 22. *R. farinosa.* 23. *R. Caucasica.*	24. *R. collina.*	25. *R. centifolia.* 26. *R. muscosa.*	27. *R. pomponia.*	28. *R. damascena.* 29. *R. bifera.*	30. *R. gallica.*	31. *R. alba.*	32. *R. montana.* 33. *R. trachyphylla.* 34. *R. eglanteria.* 35. *R. bisserrata.* 36. *R. Malmundariensis.*	37. *R. acyphylla.* 38. *R. canina.* 39. *R. verticillicantha.* 40. *R. Andegavensis.*	41. *R. rubiginosa.* 42. *R. sepium.*	43. *R. spinulifolia.*

§. III. *Réunion d'après les modifications des tubes.*			§. IV. *Réunion d'après les étamines.*	§. V. *Réunion d'après les modifications des styles.*	
XXII. TURBINATÆ.		XXIII. BRACTEATÆ.	XXIV. INDICÆ.	XXV. SYNSTYLÆ.	
Tubes des calices offrant la forme d'une toupie.		Tubes recouverts en tout ou en partie de bractées ou de feuilles floréales.	Étamines allongées, contournées, se renversant sur les styles. Lanières défléchies avant l'épanouissement.	Styles soudés, plus ou moins allongés, réunis en une petite colonne glabre ou hispide. Tiges rampantes ou érigées.	
44. *R. turbinata.* 45. *R. rapa.* 46. *R. inermis.* 47. *R. Rosenbergiana.*	48. *R. campanulata.* 49. *R. Orbessanea.* 50. *R. sulfurea.*	51. *R. bracteata.* 52. *R. clinophylla.*	53. *R. Indica.* Tous les rosiers dits du Bengale sont compris dans ce groupe.	54. *R. arvensis.* 55. *R. stylosa.* 56. *R. sempervirens.*	57. *R. moschata.* 58. *R. brevistyla.* 59. *R. Rubifolia.*

TABLE ALPHABÉTIQUE
DES NOMS DES ROSES
DÉCRITES OU CITÉES DANS LES TROIS VOLUMES DE CET OUVRAGE.

A.

R. Acyphylla, II, 31, 32, 51.
Adenophylla, III, 28.
Agathe, I, 14; II, 76.
— Aima, III, 48.
— Aimable rouge, *ibid.*
— Augustine, *ibid.*
— Augustine épineuse, *ibid.*
— Augustine sans épines, *ibid.*
— Beauté superbe, *ibid.*
— Beauté tendre, *ibid.*
— Belle Hébé, *ibid.*
— Bien-Aimée, I, 76.
— Bouquet-de-Vénus, III, 48.
— Bouquet (joli), *ibid.*
— Bouquet (tendre), *ibid.*
— Carnée, I, 76; III, 48.
— Carnée (grande), *ibid.*
— Carnée (petite), *ibid.*
— Chérie, *ibid.*
— de Francfort, I, 76; III, 48.
— de Hollande, III, 48.
— de Portugal, *ibid.*
— de Provence, III, 46, 48.
— de Provence (blanche), *ibid.*
— Enfant de France, III, 39, 40, 48.
— Ernestine, III, 48.
— Favorite, *ibid.*
— Feunon rouge, *ibid.*
— Florine, *ibid.*
— Henriette, *ibid.*
R. Agathe Héloïse, III, 48.
— Impériale, *ibid.*
— Impériale à bouquet, *ibid.*
— Impériale à plumet, *ibid.*
— Incomparable, III, 47.
— Iris nova, III, 48.
— Italienne, ou d'Italie, *ibid.*
— Marie-Louise, *ibid.*
— Maxima, *ibid.*
— Petite renoncule, III, 35, 48.
— Précieuse, I, 76; III, 47, 48.
— Prolifère, I, 76; III, 47, 48, 77.
— Redum, III, 48.
— Rose-Pierret, *ibib.*
— Royale, I, 76; III, 45, 48.
Agrestis, II, 62.
Alba, I, 97; II, 47, 48, 58, 72, 84; III, 94.
— Cannabina, I, 98.
— Carnea, I, 64, 98.
— Carnea plena, *ibid.*
— Celestis, I, 98.
— Corymbosa, *ibid.*
— Cymbæfolia, *ibid.*
— Damascena, I, 63.
— Digitaria, I, 64.
— Flavescens, I, 98.
— Flore pleno, I, 98, 117.
— Flore simplici, I, 97.
— Foliacea, III, 17.
— Geminata, I, 98.
— Humilis, I, 97.